


*Informovaný souhlas pacienta s výkonem***Konizace děložního čípku a jiné operace čípku
děložního**Identifikační štítek
pacienta**Vážená paní,**

dosavadní výsledky vyšetření ukazují na onemocnění děložního čípku. Byla Vám provedena všechna dostupná vyšetření, z kterých vyplývá, že je nutný operační výkon k přesnému určení rozsahu a charakteru onemocnění. Jde o výkon diagnostický, pomocí kterého určíme současný stav onemocnění čípku. Často jde zároveň i o výkon léčebný, kdy se odstraní postižená část čípku a není nutná další léčba, jde tedy o výkon preventivní. Podstatou operace je odstranění části děložního čípku, která je postižena nepříznivými změnami tkáně a plastická úprava čípku. Na základě podrobného vyšetření odstraněné části čípku Vám sdělíme další postup.

Vlastní operační výkon:

Operace se provádí v celkové narkóze. Přístup k děložnímu čípku je přes pochvu. Oblast změněné tkáně se vytne ve tvaru kužele, jehož vrchol směřuje k dutině děložní. Na ranné ploše se zastaví krvácení a čípek se plasticky upraví. Obvykle se připojí snesení sliznice z hrdla děložního a dutiny děložní, aby bylo možno vyloučit nepříznivé změny těchto tkání.

**Možná rizika a komplikace operačního výkonu:**

Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např. "trombóza" (vytvoření se krevních sraženin v žilách např. dolních končetin), "embolie" (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci nebo infekce v operačním poli. I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy, nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu. I v této výjimečné situaci je naší snahou zachování všech vnitřních orgánů. Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy a budou Vám vysvětleny den před operací lékařem-anesteziologem.

Možné následky výkonu:

Operace umožní mikroskopické vyšetření odebrané tkáně a posouzení jejich změn. Hojení čípku trvá obvykle asi 4 týdny a bývá *spojeno* se špiněním. Následky operace se neprojeví na menstruačním cyklu, na sexuálním životě nebo možnosti otěhotnění a porodu, i když v následném těhotenství je nutné podrobnější sledování.

Alternativa výkonu:

Výsledky provedených vyšetření ukazují na onemocnění děložního čípku. Navrhovaný operační **výkon je nutný** k přesnému určení rozsahu a charakteru onemocnění. Na základě podrobného vyšetření odstraněné části čípku pod mikroskopem Vám sdělíme další léčebný postup. V případě, že odmítnete tento zákrok, mohou se změny na děložním čípku postupně rozšiřovat a rozvinout třeba i ve zhoubný nádor, který bez adekvátní léčby může ohrozit Váš život. Výkon tedy nemá alternativu.

Režim pacientky před výkonem:

Po dobu minimálně 6 hodin před výkonem nemůžete přijímat tekutiny, stravu a kouřit. 24 hodin před zákrokem byste se měla vyvarovat užívání léků, které neberete pravidelně, zvýšené psychické a fyzické námaze. Před výkonem je vhodné se osprchovat nebo vykoupat. Do pochvy si nic neaplikujte, kromě doporučených léků gynekologem, zdržte se pohlavního styku. K zákroku buďte odličená, s nenalakovanými nehty. O anestezii Vás

bude informovat lékař – anesteziolog. Bude Vám provedena bandáž dolních končetin jako prevence TEN (trombembolické nemoci) – řeší se individuálně.

Omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní neschopnosti:

Předpokládaná délka hospitalizace je při nekomplikovaném průběhu 1-2 dny. Výkon lze také za zcela přesných a předem daných podmínek provést ambulantně. Zda výkon bude proveden ambulantně či za krátkodobé hospitalizace rozhoduje lékař oddělení po zvážení všech okolností, zvláště Vašeho zdravotního stavu. Bezprostředně po výkonu budete při nekomplikovaném průběhu monitorována na standardním pooperačním pokoji gynekologického oddělení. Za dvě hodiny po výkonu můžete chodit, jíst a pít. Po výkonu jsou tlumeny bolesti dle ordinace lékaře, přechodně se může vyskytnout nevolnost po anestezii nebo bolesti hlavy. Po operaci je nutná rekonvalescence potřebná k plnému vyhojení v délce 2- 5 dnů. Na dobu rekonvalescence lze vystavit i pracovní neschopnost. Nejméně 4 týdny po výkonu byste měla dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel, slabé krvácení (špinění) po výkonu ustává do 1-2 týdnů. První menses po výkonu se dostaví za 4-6 týdnů. Nemějte obavy, pokud se dostaví v jiném termínu než obvykle. Pracovní neschopnost se odvíjí od průběhu léčby.

Ptejte se prosím na všechno, co považujete pro Vás za důležité!

Pacientka (jméno, příjmení, rodné číslo): _____

Já, níže podepsaná, tímto prohlašuji, že jsem byla poučena o výkonu:

KONIZACE DĚLOŽNÍHO ČÍPKU A JINÉ OPERACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO

Prohlašuji, že mi bylo sděleno a vysvětleno:

- **Účel, povaha a předpokládaný přínos výkonu.**
- **Předpokládané důsledky, následky a možná rizika zdravotního výkonu.**
- **Zda existuje jiná alternativa kromě navržené zdravotní služby či výkonu, jaký je její možný přínos, důsledky a rizika a byla jsem poučena o možnosti volby.**
- **Možné omezení v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti, zdravotní způsobilosti po poskytnutí zdravotní služby či výkonu.**

Prohlašuji, že mi bylo umožněno, abych indikujícímu lékaři i lékaři specialistovi **kladla doplňující otázky**, které mi řádně zodpověděl.

Prohlašuji, že jsem podaným informacím a vysvětlením plně porozuměla, poučení považuji za **dostatečné a nemám žádných dalších otázek**.

Na základě své svobodné vůle a na základě poskytnutých informací vyslovuji tedy svůj **svobodný, informovaný souhlas s výkonem**.

Rovněž souhlasím, aby v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů, nutných k záchraně mého života či zdraví, byly tyto provedeny.

V Kroměříži dne, hod. _____

Podpis pacienta _____
či zákonného zástupce

Podpis lékaře, jmenovka _____

Podpis svědka¹ _____

¹ jméno a podpis svědků poučení souhlasu pacienta, pokud pacient není schopen se vlastnoručně podepsat.