

## Adrenalektomie otevřená

**Typ výkonu:**

Plánovaná otevřená operace

**Indikace:**

Hyperplazie kůry nadledvin (Connův syndrom, Cushingův syndrom, Feochromocytom)

Zhoubný nádor nadledviny

Metastáza zhoubného nádoru do nadledvin

Zvětšení nadledviny nad 5 cm nejasného původu a chování

**Kontraindikace:**

Nekorigovaná porucha srážlivosti krve

Celkově špatný stav pacienta

**Anestézie:**

Celková endotracheální

**Princip operace:**

Šikmý řez pod žebním obloukem na postižené straně. Postupná izolace nadledviny od okolních struktur, přerušování cévního zásobení, vynětí nadledviny z retroperitoneálního prostoru. Uzavření rány sešitím po vrstvách. Operace trvá 1-2 hodiny, v případě nutnosti odstranění obou nadledvin (Cushingův syndrom, meta postižení) 2-3 hodiny.

**Možné operační komplikace:**

Poranění jater, sleziny nebo tlustého střeva

Krvácení do dutiny břišní

U feochromocytomu extrémní výkyvy krevního tlaku

**Délka hospitalizace:**

6-10 dnů

**Rekonvalescence:**

6 - 8 týdnů