

Nefrolitomie z bederního přístupu

Typ výkonu:

Plánovaná otevřená operace.

Indikace:

Odlitková urolitiáza (kámen vyplňující celý dutý systém ledviny) nebo jinak komplikovaná urolitiáza nevhodná k jiné léčbě.

Kontraindikace:

Celkově špatný stav pacienta
Nekorigovaná porucha srážlivosti krve

Anestézie:

Celková endotracheální

Princip operace:

Šikmý řez v bederní krajině na straně postižené ledviny. Ostře i tupě proniknuto k tukovému pouzdru ledviny a provedena izolace ledviny od okolních tkání. Hlavní cévní svazek je svorkou stlačen tak, aby byl přerušen přívod krve do ledviny po dobu cca 10 minut. V tomto časovém úseku je ledvina podélně otevřena a jsou vyňaty všechny kameny. Pote je provedeno sešití dutého systému a parenchymu ledviny. Po kontrole krvácení rána uzavřena po vrstvách. Pokud existuje porucha odtoku moče z ledviny, je současně rovněž řešena. Operace trvá 2 hodiny.

Možné komplikace:

Významné krvácení z velkých cév.
Prosakování moče ranou
Snížení funkce operované ledviny
Zbytkový kámen nebo jeho část
Vytvoření nepravé kýly v jizvě v bederní krajině.

Délka hospitalizace:

7-10 dnů

Doba rekonvalescence:

2-3 měsíce.