

Nefrektomie z bederního přístupu

Typ výkonu:

Plánovaná otevřená operace (vzácně urgentní)

Indikace:

Jakékoliv nenádorové postižení ledviny vyžadující její odejmutí (nefunkční ledvina)

V některých případech prosté odstranění ledviny s nádorem před onkologickou léčbou s cílem snížení objemu zhoubných buněk v organismu (cytoredukční výkon).

Traumatické postižení ledviny

Kontraindikace:

Celkově špatný stav pacienta

Nekorigovaná porucha srážlivosti krve

Anestézie:

Celková endotracheální

Princip operace:

Šikmý řez v bederní krajině na straně postižené ledviny. Ostře i tupě proniknuto k tukovému pouzdru ledviny a provedena izolace ledviny od okolních tkání. Vyhledání odstupujícího hlavního cévního svazku vyživujícího ledvinu a jeho podvázání, zvláště tepnu a zvláště žílu, které pak přerušujeme. Vyhledán močovod, který je rovněž podvázán a přerušen. Ledvina vyňata a po kontrole krvácení rána uzavřena po vrstvách. Operace trvá 1 - 2 hodiny.

Možné komplikace:

Významné krvácení z velkých cév.

Vzácně poranění orgánů dutiny břišní (střevo, slezina)

Vytvoření nepravé kýly v jizvě v bederní krajině.

Délka hospitalizace:

7-10 dnů

Doba rekonvalescence:

2-3 měsíce.