

Plastika ledvinné pánvičky dle Anderssona-Hynese

Typ výkonu:

Plánovaná otevřená operace.

Indikace:

Hydronefróza způsobená zúžením nebo stlačením přechodu pánvičky ledvinné do močovodu.

Kontraindikace:

Celkově špatný stav pacienta
Nezvratné funkční postižení ledviny.
Nekorigovaná porucha srážlivosti krve

Anestézie:

Celková endotracheální

Princip operace:

Šikmý řez v bederní krajině na straně postižené ledviny. Ostře i tupě proniknuto k tukovému pouzdru ledviny a provedena izolace ledviny od okolních tkání včetně horní části močovodu a ledvinné pánvičky. Zvětšená část ledvinné pánvičky a zúžená část močovodu jsou odejmuty. Následuje sešití pánvičky a nové široké napojení močovodu na ledvinu. Ledviny při tom drénována 1-2 drény vyvedenými v boku pacienta na dobu asi 7-10 dnů. Po kontrole krvácení rána uzavřena po vrstvách. Operace trvá 2-3 hodiny.

Možné komplikace:

Významné krvácení z velkých cév.
Prosakování moče operační ranou
Záněť operované ledviny
Opětovné zúžení operovaného místa
Vytvoření nepravé kýly v jizvě v bederní krajině.

Délka hospitalizace:

7-10 dnů

Doba rekonvalescence:

2-3 měsíce.