

## Resekce ledviny

**Typ výkonu:**

Plánovaná otevřená operace

**Indikace:**

Zhoubný nádor ledviny

Nezhoubný nádor, nádor nejistého chování nebo jiný patologický stav v části ledviny

**Kontraindikace:**

Nekorigovaná porucha srážlivosti krve

Celkově špatný stav pacienta

**Anestézie:**

Celková endotracheální

**Princip operace:**

Z řezu v bederní krajině provedeno uvolnění celé ledviny a obvykle vypreparovány i ledvinné cévy je-li to nezbytné. Pokud je to nutné, je naložena cévní svorka na tepnu ledvinnou n nezbytnou dobu a elektrokauterem či harmonickým skalpelem je resekována postižená část ledviny, která je odstraněna. Pokud byl otevřen sběrný systém ledviny, následuje jeho sešití a zastavení krvácení a zašití defektu ledviny. Založen drén a rána ošetřena sešitím po anatomických vrstvách. Operace trvá 1-2 hodiny.

**Možné komplikace:**

Významné krvácení z velkých cév

Poranění sousedních orgánů

Infekce močových cest

Vytvoření nepravé kýly v jizvě v bederní krajině.

**Délka hospitalizace:**

7-10 dnů

**Rekonvalescence:**

2-3 měsíce