

Reimplantace močového měchýře (UCNA)

Typ výkonu:

Plánovaná otevřená operace

Indikace:

Přenesení ústí močového měchýře do jiného místa v močovém měchýři, většinou jako součást jiných operačních výkonů.

Zúžení dolního konce močového měchýře

Kontraindikace:

Nekorigovaná porucha srážlivosti krve

Akutní infekce močových cest

Celkově špatný stav pacienta

Závažné změny či onemocnění močového měchýře

Anestézie:

Celková endotracheální

Princip operace:

Proniknutí k močovodu řezem v dolní třetině břicha, vyhledání a otevření močového měchýře. Po nalezení ústí močového měchýře postupné oddělení močového měchýře od okolních tkání a stěny močového měchýře. Vytvoření nového ústí močového měchýře v jiné lokalizaci a uložení močového měchýře do něj při použití některého z plastických přístupů k zajištění ventilového mechanismu. Nově implantovaný močovod je zajištěn dočasně hadičkou vyvedenou obvykle operační ranou. Uzavření močového měchýře a sešití stěny břišní po vrstvách. Vlastní operace přenesení ústí močového měchýře trvá 1 – 2 hodiny.

Možné komplikace:

Krvácení v průběhu operace nebo po ní

Infekce močových cest

Prosakování moče, špatná funkce nového ústí močového měchýře

Délka hospitalizace:

7-10 dnů

Rekonvalescence:

6-8 týdnů