

Zavedení stentu do močového

Typ výkonu:

Akutní nebo plánovaná endoskopická operace

Indikace:

Obstrukce (ucpání) močových cest způsobená kamenem

Komprese (stlačení) močových cest způsobená zevním útlakem

Významné zúžení močového

Komprese močových cest u těhotných

Profylakticky po manipulacích a operacích na močovodech

Kontraindikace:

Těžká infekce dolních močových cest

Nádor ledvinové pánvičky, močového nebo močového měchýře

Nekorigovaná porucha srážlivosti krve

Anestézie:

Místní topická nebo svodná spinální nebo celková

Princip operace:

Prostřednictvím cystoskopu se zavádí stent od ústí močového do dutého systému ledviny. Stent lze charakterizovat jako vnitřní protézu močového, která je vyrobena ze speciálního materiálu a umožňuje dlouhodobě zajišťovat odtok moče z ledviny do močového měchýře. S výjimkou těhotných je výkon obvykle kontrolován na RTG přístroji. Operace trvá 10-30 minut.

Možné komplikace:

Dráždění močového měchýře nebo pánvičky ledviny

Krvácení do moče - hematurie

Dislokace nebo úplné vypadení stentu.

Infekce močových cest

Délka hospitalizace:

2-3 dny

Může se jednat o ambulantní výkon

Rekonvalescence:

Žádná