

Operace mužské inkontinence

Typ výkonu:

Plánovaná otevřená operce

Indikace:

Inkontinence (neudržení moče) po radikálních operacích na prostatě (otevřených, laparoskopických, robotických) nebo jiných endoskopických výkonech v oblasti svěrače.

Inkontinence po úrazech

Kontraindikace:

Celkově špatný stav pacienta

Těžká infekce dolních močových cest

Nekorigovaná porucha srážlivosti krve

Zúžení močové trubice

Předchozí ozáření operované oblasti

Anestézie:

Místní svodná spinální nebo celková endotracheální nebo laryngeální maskou

Princip operace:

Uložení tlačícího polštářku pod močovou trubici v oblasti hráze. Z krátkého řezu n hrázi vypreparujeme močovou trubici, kterou uvolníme až k pánevním kostem, pak podél močové trubice za kostmi pánevními pronikáme dlouhými jehlami do podbřišku lehce vpravo a vlevo, kde máme udělané dva krátké řezy do podkoží a pomocí těchto jehel zavádíme pásku s polštářkem. Páska je fixována v místě disky – terčíky uloženými na fascii podbřišku. Ranky jsou ošetřeny sešitím. Operace trvá 1 hodinu.

Možné komplikace:

Krvácení v ráně

Hnisání v ráně či odmítnutí materiálu organismem pacienta

Nedostatečná nebo nadbytečná korekce inkontinence

Infekce dolních močových cest

Zúžení močové trubice tlakem polštářku

Délka hospitalizace:

5-7 dní

Rekonvalescence:

2-3 týdny