

Píštělě močového měchýře

Typ výkonu:

Plánovaná otevřená operace

Indikace:

Abnormální propojení močového měchýře s okolními orgány. Nejčastěji se jedná o píštěl (propojení) mezi močovým měchýřem a pochvou, močovým měchýřem a střevem.

Kontraindikace:

Celkově špatný stav pacienta.

Píštěl v terénu zhoubného inoperabilního nádoru.

Nekorigovaná porucha srážlivosti krve

Anestézie:

Celková endotracheální

Princip operace:

Po proniknutí k močovému měchýři a orgánu postiženého píštělí je kanál píštěle i s okolními tkáněmi odstraněn tak, aby zůstala k dispozici zdravá tkáň. Defekty v močovém měchýři, pochvě případně střevu jsou sešity tak, aby tkáň nebyla pod tahem, a je-li to vhodné a možné, je mezi obě sutury (švy) vložena jiná, zdravá tkáň například sval nebo předstěra. Jedná-li se o píštěl do střeva, je velmi často příčinu této píštěle střevní onemocnění, které musí také být při operaci rovněž léčeno, velmi často resekci střeva (vytětím části tenkého či tlustého střeva). Rána se uzavřena po vrstvách a močový měchýř je po dobu hojení drénován močovým katétrem. Operace trvá v závislosti od rozsahu postižení 1-3 hodiny.

Možné komplikace:

Krvácení v průběhu operace, nebo bezprostředně po ní.

Nezhojení defektu a vytvoření nové píštěle.

Délka hospitalizace:

7-10 dní

Rekonvalescence:

2-3 měsíce