

## Radikální cystektomie

### **Typ výkonu:**

Otevřená plánovaná operace

### **Indikace:**

Zhoubný nádor močového měchýře vyžadující jeho kompletní odstranění  
Svráštělý močový měchýř (chronický zánět měchýře, stav po radioterapii, TBC)  
Velká píštěl mezi močovým měchýřem a zažívacím traktem, případně vagínou.  
Neurogenní porucha močového měchýře

### **Kontraindikace:**

Nádorové proniknutí do okolí měchýře a velkých cév  
Průkaz vzdálených metastáz v jiných orgánech  
Celkově neuspokojivý a špatný stav pacienta  
Nekorigovaná porucha srážlivosti krve

### **Anestézie:**

Celková endotracheální

### **Princip operace:**

Řezem v podbřišku je široce otevřen prostor malé pánve z dutiny břišní. Z levé i pravé strany jsou vypreparovány lymfatické uzliny a odstraněny. Postupně se uvolní přední a zadní stěna močového měchýře a poté jsou vyhledány oba močovody a přerušeny. U mužů spolu s močovým měchýřem je vypreparována i prostata a semenné vajíčky a v jednom preparátu po přerušení močové trubice odstraněny z malé pánve. U žen tento preparát tvoří spolu s močovým měchýřem také vaječníky, tuby, přední stěna pochvy a děloha. Cystektomie je zpravidla první částí celkové operační intervence, která trvá 2-3 hodiny. Druhou částí operace je následné zajištění odtoku moče některým z možných řešení – viz derivace moče.

### **Možné komplikace:**

Poranění konečníku  
Poranění velkých cév a krvácení  
Zánět dutiny břišní a celková sepse  
Neprůchodnost střevní  
Tromboembolická nemoc  
Infekce v operační ráně

### **Délka hospitalizace:**

10-14dnů

### **Rekonvalescence:**

2-3měsíce.