

Prostatektomie transvezikální

Typ výkonu:

Plánovaná otevřená operace

Indikace:

Nezhoubné zbytnění prostatické žlázy o objemu více jak 50 g s klinickými projevy po selhání konservativní terapie nebo při ohrožení horních močových cest.

Nezhoubné zbytnění prostaty v kombinaci s dalším onemocněním, jako jsou např. kameny v močovém měchýři či výchlipka močového měchýře

Kontraindikace:

Nekorigovaná porucha srážlivosti krve

Celkově špatný stav pacienta

Septický stav

Anestézie:

Místní svodná spinální nebo celková

Princip operace:

Svislý řez mezi kostí stydkou a pupkem v délce 8-12 cm. Otevřen močový měchýř, tlakem prstu operujícího lékaře proti kosti stydké proniknuto do vrstvy mezi zbytnělou tkání prostaty a zbytkem normální tkáně. Postupně tupé oddělení zbytnělé tkáně ve všech směrech a přerušení jejího spojení s močovou trubicí. Po vyjmutí zbytnělé tkáně prostaty zástava krvácení a úprava hrdla močového měchýře tak, aby mohl být spolehlivě uložen tamponující močový katétr. Sešití rány po vrstvách. Operace trvá 1 hodinu.

Možné operační komplikace:

Větší krvácení v průběhu operace nebo v pooperačním průběhu

Poranění okolních struktur, zejména svěrače močového měchýře

Infekce močových cest nebo genitálu

Délka hospitalizace:

7-10 dnů

Rekonvalescence:

2-3 měsíce