

## Orchidopexie

**Typ výkonu:**

Plánovaná otevřená operace

**Indikace:**

Nesestouplé varle nebo jeho chybné uložení (ektopie)

**Kontraindikace:**

Uložení varlete hluboko v dutině břišní (břišní kryptorchismus)

Běžné překážky operačního výkonu.

**Anestézie:**

Celková

**Princip operace:**

Tříselný řez na postižené straně, otevření tříselného kanálu, zde obvykle nacházíme nesestouplé varle, které je uvolněno od okolních struktur a uloženo do správné polohy do šourku, buď s dalším řezem na šourku, nebo bez něj. Pak provedena plastika třísla a uzavření rány po vrstvách. Operace trvá 30 - 45 minut.

**Možné operační komplikace:**

Varle je zjevně postižené a jeho uložení do správné polohy nemá smysl, je nutné jej odstranit – takové varle je rizikové do budoucna stran vzniku nádoru.

Varle není možno izolovat od okolních tkání tak, aby mohlo být volně uloženo do šourku.

Varle i přes správné uložení do šourku se nevyvíjí normálně.

Drobné krvácení s vytvořením hematomu.

**Délka hospitalizace:**

2-3 dny

**Doba rekonvalescence:**

1-3 týdny