



Edukace pacienta po operaci LOKTE

Vážený pane, vážená paní,

děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil/a/ tím, že jste se svěřil/a/ do naší péče. Snahou nás všech je poskytnout Vám kvalitní zdravotní i ošetrovatelskou péči na profesionální úrovni, ohleduplně a s porozuměním Vám co nejdříve pomoci k dosažení a upevnění Vašeho zdraví.

Doporučení a rady při propuštění z našeho ortopedického oddělení, Vám budou poskytnuty ústně lékařem, sestrou i fyzioterapeutem a také formou tohoto informačního letáku, kde máte v bodech vypsány základní rady a informace.

- **Operační ránu** udržujte v suchu a čistotě a nechejte zakrytou do příští kontroly na ortopedické ambulanci – **datum příští kontroly** určí lékař při propuštění.
- Operovanou HK končetinu je nutno mít ve zvýšené poloze (v ortéze nebo šátku).
- Kontrolujte hybnost a citlivost HK.
- Procvičujte jen prsty HK (otvírání a zavírání v pěsti), dále pak postupujte dle pokynů lékaře při kontrole na ortopedické ambulanci.
- Pokud Vám byla po operaci přiložena **sádrová dlaha** nebo **sádra** – sledujte prokrvení prstů, otok DK a v případě pocitu útlaku - přijďte na kontrolu ihned.
- V případě, že je operační rána přelepená speciální náplastí můžete se do vytažení stehů **sprchovat** – ránu nemydlit a nemazat. Koupat se můžete až po **vytažení stehů** (pokud lékař neurčí jinak) – to je cca za 7–10 dnů po operaci. Po vytažení stehů, můžete jizvu promazávat mastí (např. vazelínou nebo měsíčkovou mastí).
- Při **bolesti** užíjte léky předepsané na recept, ev. Paralen, Ibalgin nebo jiná analgetika na která nemáte alergii.
- V případě potíží – přetrvávající bolest, vysoké tělesné teploty, pocit smýkání v operační ráně, sekrece z operační rány, bolesti lýtky DK - přijďte na kontrolu ihned.
- **Propouštěcí zprávu** odevzdejte Vašemu praktickému lékaři.

Kolektiv ortopedického oddělení Vám přeje brzké uzdravení.